

Persönliche Patientendaten

Name Vorname Geburtsdatum

Beh. Arzt/Telefon Verantwortliche Pflegefachkraft/Telefon

Anamnese

Erstwunde Ja Nein Rezidiv Ja Nein Wunde besteht seit Entstehungsursache

Wundart Diabetisches Fußsyndrom (n. Wagner/Armstrong)

Therapierelevante Diagnose/n Polyneuropathie pAVK (n. Fontaine) CVI (n. Wittmer) Angiopathie Hammerzeh

Hallux Valgus Charcot Fuß Hautmykose Nagelmykose Zustand nach Amputation Lokalisation


Sonstiges

Medikamente, siehe Medikamentenplan Allergien Nein Ja, siehe Allergiepass

Bisherige Wundtherapie Trocken/Salbenverbände Ideal-feucht Unterdrucktherapie Sonstige

Hautschutz/-pflege:

Lokalisation, siehe Skizze (evtl. vorhandene Fotos am Bogen befestigen)



Einflussfaktoren

Fehlendes Krankheitsverständnis Trägt einschnürende Kleidung Geschwächter Immunstatus Konsum. Grunderkrankung Alkohol/Drogen Rauchen (Zig./Tag)

Kachexie Adipositas Exsikkose Tablettenabusus Psyche Stress Inkontinenz

Schmerz Falsches Schuhwerk Mangelhafte Fußpflege z. B. eingewachsene Zehennägel, Ragerden, Fissuren, Hyperkeratosen Hauterkrankung/Ekzem

Teilweise Immobil Vollständig Immobil Schlecht eingestellter Diabetes HBA1C-Wert:

Sonstige

Wund- und therapiebedingte persönliche Einschränkungen

Hohe Exsudatmengen Unangenehme Gerüche Mobilitäts-/Aktivitätseinschränkungen Abhängigkeit von Anderen/fremder Hilfe Schlafstörungen

Traurigkeit/Perspektivlosigkeit Eingeschränkte Kleidungs-/Schuhauswahl Schwierigkeiten bei der persönl. Hygiene Soziale Isolation Ängste/Sorgen

Sonstige

Schmerzen

Schmerztherapie Ja, siehe Medikamentenplan Nein Schmerztagebuch Ja Nein

Stärke (siehe VAS-Skala)

Arzt wurde/wird über die aktuelle Schmerzsituation informiert, von Patient/Angehöriger Pflegefachkraft

Letzte Gefäßdiagnostik Wann? Wo? Von wem?

Fußpuls tastbar rechts

Arteria tibialis posterior Arteria dorsalis pedes Arteria fibularis

links

Arteria tibialis posterior Arteria dorsalis pedes Arteria fibularis

Ödeme

Nein Positive Stemmerzeichen

re.¹ Wade cm re.¹ Knöchel cm re.¹ Vorfuß cm li.² Wade cm li.² Knöchel cm li.² Vorfuß cm

¹rechts ²links

Zusatzmaßnahmen zur Wundtherapie

Druckentlastung Bettruhe Rollstuhl Unterarmgehstützen

Schuhversorgung Vorfuß-/Rückfußentlastungsschuh Orthese Vollkontakt-Gips (In 2-Schalen-Technik nach Total Contact Cast) Diabetes adaptierte Verbandsschuhe Sonstiges

Podologische Behandlung Häufigkeit

Diabeseinstellung/Überweisung an Diabetologe Gangschulung/Fußgymnastik Raucherentwöhnung

Datum Unterschrift

pAVK = periphere Arterielle Verschluss Krankheit; CVI = Chronisch Venöse Insuffizienz; Zig. = Zigaretten; VAS = Visuelle Analog Skala

